



Asbl Organisme Interprofessionnel  
Route de Herve, 104  
4651 BATTICE  
Tél. 087/69.26.30  
Fax 087/69.26.40  
E-mail : [info@comitedulait.be](mailto:info@comitedulait.be)

**Comité du Lait**

## Information octobre 2011

*Pour la santé du pis et la qualité  
du lait... Portez des gants et  
désinfectez-les !*



Il est primordial de se laver les mains et les avant-bras à l'eau et au savon et les sécher avant de commencer la traite, de recouvrir les plaies avec un pansement étanche (présence de staphylocoques) ou de porter des gants propres jetables. Si les mains ou les gants sont salis pendant la traite, il faut les laver.

Des mains propres, sèches et saines réduisent le risque de propagation de germes pathogènes pouvant provoquer une mammite d'une traite à l'autre et/ou d'une vache à l'autre.

⇒ **Le port de gants jetables accompagné éventuellement de manchettes est vivement conseillé :**

Selon une étude du RCRMB (Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine) réalisée en 2007-2008, 54% des producteurs laitiers Canadiens portent des gants durant la traite. Ils le font car ils savent que la majorité des infections à Staph. aureus sont transmises lors de la traite et que le port des gants permet de prévenir la moitié d'entre elles.

Le port de gants permet d'empêcher les bactéries et la saleté de se loger dans les rugosités et les plis de la peau des mains. Il protège les mains des effets caustiques des désinfectants et permettent un nettoyage fréquent des mains sans les irriter. Il permet également plonger les mains dans une solution d'eau « très chaude » (si préparation des pis avec des lavettes humides).

Le port de gants jetables permet également de réduire la propagation de bactéries des mains de l'opérateur au lait cru.

Il existe des gants en Latex en Vinyl ou en Nitril (plus résistant). Ils sont disponibles en plusieurs tailles et peuvent être poudrés ou non.

⇒ **Le port des gants et leur désinfection durant la traite réduit la charge bactérienne :**

Selon une étude hollandaise (Olde Riekerink et coll., 2008), le port des gants et leur désinfection durant la traite réduit de 98% la charge bactérienne comparativement aux mains nues non désinfectées.



Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter :

[www.comitedulait.be](http://www.comitedulait.be) - Tél : 087/69 26 30 - email : [thierry.jadoul@comitedulait.be](mailto:thierry.jadoul@comitedulait.be)