

Bonnes pratiques de traite en Wallonie

Fiche technique
2018-05



Source photos : Comité du Lait - Battice

Publications de l'Observatoire de la santé mammaire, basée sur les projets de recherche 2005-2015 Ecopathologique, LAECEA, Mammipack, MammiScan. L'observatoire s'engage à vous aider à diminuer les consommations d'antibiotiques générés par la mammite bovine !

Pour la réduction des cellules somatiques du lait, l'OSaM recommande les pratiques de traites utilisées par les meilleurs troupeaux en Wallonie niveau Cellule :

1. **Avant la traite** : Eliminer les **PREMIERS JETS** pour réduire le risque de laisser passer dans le tank le lait d'une vache infectée. De plus, cela favorise la libération de l'ocytocine et facilite donc la traite.



2. **Après chaque traite** :

- Nettoyer correctement les **MANCHONS**. Des manchons souillés augmentent le risque de transmission des germes environnementaux pendant la traite ;
- Laver les **LAVETTES** en machine à laver à 60°C avec un produit adapté (détergent et désinfectant) ou utiliser du papier à usage unique ;
- Eviter **L'EGOUTTAGE** (action qui consiste à appuyer sur la griffe en fin de traite) ;
- Pratiquer le **POST-TREMPAGE** : tremper l'entièreté du trayon dans une solution agréée au moyen d'un gobelet sans reflux (le spray consomme davantage de produit) ;
- IDENTIFIER les vaches à cellules et les vaches traitées à l'aide d'un bracelet ;

3. Toute l'année, prévoir dans la stabulation un **BOX DE VELAGE** propre ;

4. Maintenir son troupeau à **MOINS DE 250.000 CELLULES/ml**.

5. Maintenir son troupeau à moins de 25 % de vaches à plus de 400.000 cellules/ml.

En ce qui concerne les mammites cliniques, l'OSaM a démontré de meilleurs résultats dans les exploitations qui utilisaient les pratiques suivantes :

1. Pratiquer un **PRE-TREMPAGE** : appliquer une solution agréée sur la peau des trayons avant la traite et réessuyer après au moins 30 sec au moyen d'un papier absorbant ;
2. Effectuer une traite **RAPIDE** et **SANS STRESS** : poser la griffe après une stimulation des trayons (expulsion des premiers jets, lavage, ressuyage) de 60 à 90 secondes ;
3. Effectuer la **TONTE** de la mamelle ;
4. Loger ses animaux en stabulation libre à logette, équipée d'un **BOX DE VÊLAGE** ;
5. Désinfecter les manchons selon un protocole rigoureux et raisonné (rinçage après désinfection, ordre de passage, ...).

